

Sorafénib Nexavar®

Présentation

Comprimés ronds, rouge dosés à 200 mg.

Comment et quand prendre mon médicament ?

Modalités de prise

La posologie recommandée est de 400 mg par jour en 2 prises par 24h (dose totale 800 mg).

Administration par voie orale matin et soir, tous les jours à la même heure avec un grand verre d'eau. **Respectez un intervalle de 12 heures** entre la prise du matin et du soir. **Ce traitement peut être pris pendant le repas si celui-ci est pauvre en graisse.** En cas de repas riche en graisses, les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant ou 2 heures après le repas. Vous ne devez jamais couper, écraser, mâcher, ni sucer les comprimés de NEXAVAR®.

Que dois je faire si j'oublie de prendre mon traitement ?

Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: **attendez la prise suivante.** Si le moment de prendre la dose suivante est proche ne doublez pas les quantités.

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament?

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de la liste des effets indésirables. Il est possible que vous n'en ressentiez aucun. La plupart sont réversibles et tous répondent à une baisse de la posologie. Les déclarer au médecin et au pharmacien

- ✓ **Troubles digestifs:** nausée, diarrhée, vomissement, douleur gastro-intestinale, constipation
→ **Conseils :** buvez au moins 2 l d'eau par jour en cas de constipation.
Prenez, si nécessaire, les antiémétiques prescrits par votre médecin en cas de vomissements au moins 1h avant la prise de NEXAVAR® et faites des repas légers et fractionnés (5 à 6 repas par jour).
- ✓ **Augmentation de la tension artérielle surtout au début de traitement .**
- ✓ **Troubles hématologiques:** baisse des lymphocytes et des leucocytes, anémie, thrombopénie, saignement.
- ✓ **Sensation de faiblesse.**
- ✓ **Troubles du métabolisme:** Hypophosphatémie, hypocalcémie .
- ✓ Elévation de l'amylasémie et de la lipasémie.
- ✓ **Troubles cutanés:** Acné, alopecie. Syndrome mains pieds (picotements, rougeurs, douleurs), rash, prurit, érythème, sécheresse et desquamation cutanées.
→ **Conseils :** Utilisez un savon doux (sans parfum et antiseptique) et appliquer une crème hydratante.

Quelles sont les interactions possibles avec mon traitement ?

- L'association avec d'autres médicaments peut diminuer (inducteur enzymatique) ou augmenter (inhibiteur enzymatique) les effets du Sorafénib.
- Diminution du taux plasmatique du Sorafénib avec probable perte d'efficacité avec les médicaments suivants (dexaméthasone, phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital, rifampicine)
- Médicaments à utiliser avec précaution: Anti-vitamine K (augmentation de leur taux), surveillance de l'INR.

L'AUTOMEDICATION PEUT-ÊTRE DANGEREUSE: il existe un risque d'interactions médicamenteuses également avec certains produits à base de plantes comme le millepertuis (diminution de l'activité du Sorafénib). Demandez toujours l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Observance

La prise régulière de mon traitement en continu est importante pour une meilleure réponse thérapeutique.

A quoi sert mon médicament ?

- ✓ Le Sorafénib a pour nom de spécialité pharmaceutique NEXAVAR®.
- ✓ C'est une thérapie ciblée orale, un inhibiteur multi kinase ayant des propriétés antiprolifératives et anti-angiogéniques indiqué pour le carcinome hépatocellulaire.

Quelles sont les mises en garde avec mon traitement ?

- ✓ NEXAVAR® peut provoquer une **chute modérée des cheveux**. Limitez les soins agressifs .
- ✓ Surveillance de la fonction rénale chez la personne âgée.
- ✓ Surveillance de la tension artérielle.
- ✓ **Pratiquez une activité physique**
- ✓ Si vous partez en vacances, emportez toujours votre ordonnance.
- ✓ Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement.

CONSERVATION

- ✓ Dans sa boîte d'origine.
- ✓ A une température ambiante ne dépassant pas 25°C.
- ✓ Ne pas laisser le traitement à la portée de tous, et en particulier des enfants.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

- la coordination transplantation du CHB:

Tél: 01 45 59 64 22
entre 9h et 19h la semaine

Si vous n'arrivez pas à joindre la coordination:

- un pharmacien de l'hôpital :

Tél: 01 45 59 32 14

- votre médecin traitant

Pharmacie et CHB

Hôpital Paul Brousse

12, avenue Paul-Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Juillet 2013

Sorafénib

NEXAVAR®

Fiche d'information

aux patients transplantés
hépatiques

du Centre Hépatobiliaire (CHB)
de l'hôpital Paul Brousse (Villejuif)

*Ce fascicule est destiné à vous
aider à répondre à vos
éventuelles questions.*

